

从马来西亚进口原木中输入的天牛

LONGICORN BEETLES IMPORTED WITH LOGS FROM MALAYSIA

关键词 马来西亚 原木 输入 天牛

Key words Malaysia Logs Imported Longicorn beetles

最近,笔者在鉴定由中华人民共和国广州动植物检疫所雷淑耀同志送来的从马来西亚进口原木中输入的天牛,共有八种。其中三种〔黄八星白条天牛 *Batocera rubus* Linnaeus 1758, 地衣天牛 *Palimna annulata* (Olivier) 1792及刺缝裂眼天牛 *Dialeges pauper* Pascoe 1856〕在国内有分布。这些新输入的天牛种类,有可能在与马来西亚气候相近的我国南部地区存活而成为新的木材害虫。为此, 极需我国有关方面在各口岸立即加强对进口林木的检疫工作, 并建议就地采用辐射杀虫或其它措施杀灭进口原木中的天牛等害虫, 以免蔓延为害。

天牛亚科 Cerambycinae

刺缝裂眼天牛 *Dialeges pauper* Pascoe 1856

1983年7月由马来西亚进口杂木中采得。分布 云南(西双版纳); 马来西亚、印度、孟加拉、新加坡、加里曼丹。

皱额长喙天牛 *Chloridolum cinnyris* Pascoe 1866

1982年7月16由沙撈越杂木及1983年4月13日从马来西亚杂木中采得。

分布 马来西亚、缅甸、爪哇、加里曼丹、老挝。

长喙天牛 *Chloridolum* sp.

1982年7月16日从沙撈越杂木及1983年4月9日、13日、5月20日从马来西亚杂木中采得。

疾天牛 *Noserius tibialis* Pascoe 1857

1983年7月从马来西亚杂木中采得。

分布 马来西亚、马来亚、缅甸、爪哇、加里曼丹、老挝。

脊虎天牛 *Xylotrachus* sp.

1983年7月从马来西亚杂木中采得。

附虎天牛 *Perissus* sp.

1983年4月9日从马来西亚杂木中采得。

沟胫天牛亚科 Lamiinae

黄八星白条天牛 *Batocera rubus* Linnaeus 1758

1983年4月9日从马来西亚杂木中采得。

寄主 木棉、榕、柳、枫杨、重阳木、刺桐、鸡骨常山、美洲胶等。

分布 广东、江西、四川、台湾; 越南、马来西亚、老挝、印度、朝鲜。

地衣天牛 *Palimna annulata* (Olivier) 1792

1983年4月9日从马来西亚杂木中采得。

寄主 芒果、肉托果、厚皮树、酸枣等。

分布 广东、云南; 越南、泰国、印度、老挝、爪哇、苏门答腊、马来西亚、加里曼丹、东印度群岛。

华立中 (Hua Lizhong)

(中山大学)

本文1984年6月27日收到